



EVOLUȚIA ILI & ARI & PNEUMONII SĂPTĂMÂNILE 40&41 (SEZONUL 2021/2022)


Cazuri ILI vs. detectii/izolari
sezon 2021-2022



Evolutia cazurilor ARI cu prag epidemic
sezon 2021/2022



Cazuri de pneumonie în sezonul 2021/2022 vs. număr internări (%)



<i>Pattern</i>	<i>No influenzaactivity</i>
Intensitate	<i>scăzută</i>
Tendință	-
Virusuri detectate	-
Virus dominant	-
Rată pozitivitate probe	-
Caracterizare antigenică (HAI)	-
Decese	-
Caracterizare genetică	-
Sensibilitate la antivirale	-
Impact pe serviciile medicale	<i>Ssver din cauza COVID-19</i>

GRIPA ÎN EUROPA

Săptămâna 41/2021 (11 - 17 octombrie 2021)

Activitatea gripei a fost scăzută în întreaga Regiunea Europeană, deși Croația și Kârgâzstan au raportat activitate gripală timpurie legată de circulația A(H3).

Virusuri gripale au fost detectate sporadic în probele recoltate de la persoanele cu boli respiratorii care s-au prezentat pentru îngrijiri medicale , cu o ușoară creștere comparativ cu săptămâna precedentă.

Au fost detectate atât virusurile de tip gripal A, cât și cele de tip B, predominând subtipul A (H3).

Infecția cu virus de tip A a fost raportată la doi pacienți aflați în secțiile de terapie intensivă. Șapte pacienți cu SARI în spitale au fost infectați cu virusuri A (H3).

Indicatori calitativi

Pentru săptămâna 41/2021, din 36 de state membre și zone care au raportat intensitatea activității gripale, 35 au raportat o valoare intersezonieră sau o intensitate scăzută. Luxemburg a raportat o intensitate ridicată din cauza ratelor ridicate de ILI și IRA, dar nu au fost detectate virusuri gripale.

Din cele 35 de state membre și zone care au raportat răspândirea geografică, toate nu au raportat activitate sau activitate sporadică .

De reținut:

Evaluarea indicatorului de intensitate a activității include luarea în considerare a ratelor ILI sau ARI. Aceste rate de ILI sau ARI pot fi determinate de alte infecții respiratorii decât gripa, inclusiv SARS-CoV-2, ceea ce duce la creșteri observate în absența detecțiilor virusului gripal.

Evaluarea indicatorilor de intensitate și răspândire geografică include luarea în considerare a datelor de detectare a virusului gripal din unitățile santinelă și non-santinelă. Detectările virusului gripal non-santinelă, adesea mai mari, s-ar putea traduce prin raportarea unei răspândiri geografice ridicate chiar și în absența detecțiilor din unitățile santinelă.



Comitetul de Redacție:

Redactor Șef: Dr. Viorel Alexandrescu, , Biol. Mihaela Lazar

Tehnoredactare: Anca Vătășescu

Sunt utilizate date de la INSP– CNSCBT, Unitățile Santinelă,DSP-uri județene, ECDC, OMS (WER), MMWR,CDC-Atlanta

