



Buletinul Științific al Academiei de Științe Medicale

Numărul 179/ 21 noiembrie 2025

ALERTA OMS PRIVIND ESCALADAREA REZISTENȚEI LA ANTIBIOTICE A *NEISSERIA GONORRHOEAE*

Raportul recent publicat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), prin intermediul Programului Îmbunătățit de Supraveghere Antimicrobiană Gonococică (ESGAP), evidențiază o tendință epidemiologică alarmantă caracterizată prin creșterea prevalenței tulpinilor de *Neisseria gonorrhoeae* multidrog-rezistente.

Analiza datelor colectate în intervalul 2022–2024 relevă o degradare semnificativă a sensibilității la agenții terapeutici de primă linie. Concret, ratele de rezistență la **ceftriaxonă** și **cefiximă** – standardul actual de îngrijire – au înregistrat creșteri substanțiale, de la 0,8% la 5% și, respectiv, de la 1,7% la 11%. Această evoluție este considerată critică, având în vedere că aceste cefalosporine reprezintă ultimele opțiuni empirice fiabile pentru monoterapie.

Suplimentar, rezistența la **azitromicină**, frecvent administrată în terapia combinată pentru potențarea eficacității clinice, a crescut de la 0,5% la 4%. De asemenea, se menține un nivel extrem de ridicat al

rezistenței la **ciprofloxacină**, identificată în proporție de 95% dintre izolatele testate.

Studiul se bazează pe analiza a 3.615 cazuri raportate în 2024 provenind din 12 state (Brazilia, Cambodgia, India, Indonezia, Malawi, Filipine, Qatar, Africa de Sud, Suedia, Thailanda, Uganda și Vietnam), cele mai ridicate rate de rezistență fiind documentate în Cambodgia și Vietnam.

Gonoreea, cu o incidență globală estimată la 82 de milioane de cazuri anual, este catalogată de OMS drept o amenințare urgentă la adresa sănătății publice. Eșecul terapeutic poate conduce la sechele severe, inclusiv boală inflamatorie pelvină, sarcină ectopică și infertilitate feminină.

Dr. Tereza Kasaeva, director al Departamentului OMS pentru HIV, TBC, Hepatită și ITS, a subliniat imperativul integrării supravegherii gonococice în programele naționale de sănătate, datele ESGAP fiind esențiale pentru fundamentarea strategiilor de prevenție și răspuns. Totodată, speranțe terapeutice noi sunt legate de doi agenți aflați în studii clinice avansate: zoliflodacina și gepotidacina.

Datele impun o mobilizare globală urgentă pentru monitorizarea rezistenței, implementarea unor politici stricte antimicrobial stewardship și accelerarea cercetării pentru dezvoltarea de noi clase terapeutice, în vederea prevenirii unui impas terapeutic major în managementul infecțiilor cu transmitere sexuală.

Tradus și adaptat după Chris Dall, 19 noiembrie 2025



Colectiv de redacție: CS 1 Dr. Viorel Alexandrescu
Prof. Dr. Mircea Beuran
Prof. Dr. Emanoil Ceaușu
Dr. Gabriel - Cristian Văcaru
Tehnoredactare: Ref. Narcisa Samoilă
Traducere: Alexandra Buzoianu
Site: <https://www.adsm.ro>