



SUPRAVEGHEREA ARI & ILI & SARI ÎN SĂPTAMÂNA 3 DIN SEZONUL 2020/2021

Cazuri ILI vs. detectii/izolari
sezon 2020-2021





Cazuri de pneumonie în sezonul 2020/2021 vs. număr internări (%)



Pattern	sporadic
Intensitate	scăzută
Tendință	în scădere
Virusuri detectate	1 A, 2 B
Virus dominant	-
Rată pozitivitate probe	-
Caracterizare antigenică (HAI)	-
Decese	-
Caracterizare genetică	-
Sensibilitate la antivirale	-
Impact pe serviciile medicale	scăzut

Vaccinări anti-COVID-19 de la 27.12.2020 - până la 28.01.2021 . Ora 17
Vaccinări antigripale până la 24.01.2021



SĂPTĂMÂNA 03/2021 (18-24 IANUARIE 2021)

- Activitatea gripală a rămas la niveluri inter-sezoniere.
- Din 1.246 de probe testate pentru gripă în săptămâna 03/2021, de la pacienții care prezintă simptome ILI sau ARI prezentați la centrele de asistență medicală primară sentinelă, unul a fost pozitiv pentru un virus gripal.
- Virusuri gripale au fost detectate sporadic din surse non-sentinelă (cum ar fi spitale, școli, instituții de îngrijire primară care nu sunt implicate în supravegherea santinelelor sau case de îngrijire medicală și alte instituții). Au fost detectate atât virusurile gripale de tip A, cât și cele de tip B.
- În săptămâna 03/2021 a fost raportat un caz de gripă spitalizat confirmat de laborator.
- Sezonul gripal din regiunea europeană de obicei desemnat ar fi trebuit să înceapă până în acest moment al anului, dar, în ciuda testării răspândite și regulate pentru gripă, activitatea gripală raportată rămâne la un nivel foarte scăzut. Noua pandemie a bolii coronavirus 2019 (COVID-19) a afectat comportamentele celor care solicită asistență medicală, furnizarea de asistență medicală și practicile și capacitățile de testare din țările și zonele regiunii europene, care au avut un impact negativ asupra raportării datelor epidemiologice și virologice ale gripei în timpul sezonului 2020/2021 2021. Datorită pandemiei COVID-19, datele gripale pe care le prezentăm vor trebui interpretate cu prudență, în special în ceea ce privește tiparele sezoniere.

INDICATORI CALITATIVI

- Din 36 de țări și zone care au raportat intensitatea indicatorului de activitate, 33 au raportat niveluri bazale, iar 3 (Azerbaidjan, Estonia și Slovacia) au raportat intensitate scăzută pentru săptămâna 03/2021.
- Din 36 de țări și zone care au raportat răspândirea geografică, 32 au raportat nicio activitate și 4 (Azerbaidjan, Danemarca, Portugalia și Regatul Unit (Anglia)) au raportat răspândire sporadică pentru săptămâna 03/2021.

Vă rugăm să rețineți:

1. Evaluarea intensității indicatorului de activitate include luarea în considerare a ratelor ILI sau ARI. Aceste rate ILI sau ARI pot fi determinate de alte infecții respiratorii decât gripa, inclusiv SARS-CoV-2, ducând la creșteri observate în absența detecțiilor gripei.
2. Evaluarea intensității și a indicatorilor de răspândire geografică include luarea în considerare a datelor de detectare a virusului gripal din unități sentinelă și non-sentinelă. Detecțiile virusurilor gripale din unitățile non-sentinelă, adesea mai mari, s-ar putea traduce prin raportarea răspândirii geografice ridicate chiar și în absența detecțiilor santinelă.



Comitetul de Redacție:

Redactor Șef: Dr. Viorel Alexandrescu, , Biol. Mihaela Lazar

Tehnoredactare: Anca Vătășescu

Sunt utilizate date de la INSP- CNSCBT, Unitățile Sentinelă, DSP-uri județene, ECDC, OMS (WER), MMWR, CDC-Atlanta

